

허리 디스크로 오인하기 쉬운 [대퇴골두 무혈성 괴사]

최신 의학 패러다임과 근거 기반 감별 진단 및 관절 보존 치료법

1. 서론: 요통 뒤에 숨은 심각한 고관절 경고


"허리가 너무 아파서 제대로 걸을 수 없다"며 내원하시는 환자분들 중 상당수는 자신의 증상을 단순 허리 디스크(요추 추간판 탈출증)나 협착증으로 생각하시곤 합니다 [1, 3, 4]. 그러나 꼼꼼한 진찰을 해보면, 반드시 감별해야 하는 심각한 고관절 질환인 '대퇴골두 무혈성 괴사(ONFH)'인 경우가 존재합니다 [1, 3, 4, 6].

불필요한 X-ray 촬영을 지양하더라도, 고관절 질환이 의심되는 경우에는 고관절 X-ray 및 CT, MRI 등의 정밀 영상 검사를 꼭 시행해야 합니다 [3, 4, 6]. 검사 여부는 단순 통증 호소가 아닌, 전문의의 꼼꼼한 신체검사(Physical Examination)를 바탕으로 신중히 결정해야 합니다 [3, 4].

최신 의학적 패러다임에 따르면, 본 질환은 단순 관절 과사용이 아니라 유전적 소인(가족력/유전자 변이), 세포 감각 스위치(미세혈류 장애 및 메카노센싱 이상), 그리고 환경적 자극(스테로이드 사용, 과도한 음주)이 복합 작용하여 발병하는 유전-세포-기계적 종합 질환입니다 [1, 3, 6].

2. 요통 오인의 이유와 세포·유전적 발병 원리

고관절과 요추 신경 경로는 밀접하게 공유되어 통증 부위가 겹칩니다 ('고관절-척추 증후군') [4]. 초기 괴사 시 사타구니, 엉덩이, 허벅지 안쪽에 뻣근한 방사통이 발생하여 허리 디스크와 오인되기 쉽습니다 [3, 4]. 단순 X-ray로는 초기(ARCO I, II단계) 괴사를 발견하기 어려우므로, FABER 테스트 및 내회전 검사 후 이상 시 MRI/CT 정밀 검사가 필수적입니다 [3, 4, 6].



[그림 1] 대퇴골두 무혈성 괴사의 미세혈류 장애 및 골함몰 진행 메커니즘

3. 대규모 연구 데이터: 오진율, 원인 비율 및 최신 치료법

● 906명 임상 연구 데이터 [Liu et al. 2024]:

- 초진 시 오진율: 31.57% (가장 흔한 오진 1위: 요추 추간판 탈출증)
- 유발 원인 비중: 과도한 음주(44.81%), 특발성(25.39%), 스테로이드 복용(21.85%), 외상성(7.95%)
- 피크 연령대: 남성 40대, 여성 50대의 왕성한 활동 연령층

● 국내 68,085건 빅데이터 분석 [Park et al. 2022]:

- 수술 건수 2007년 3,824건에서 2018년 6,929건으로 약 1.8배 증가
- 인공관절 전치환술(THA) 비율이 전체 수술의 86% 차지 (초기 진단 미흡 반영)

● 2024-2026 최신 관절 보존 치료 임상 근거:

- 중심감압술(CD) + 골수줄기세포(BMAC) 병용 시, 단순 감압술 대비 골두 함몰 및 인공관절 전환율 50% 이상 감소 (RR=0.47, 0.41) [Tang et al. 2025, Niu et al. 2026]
- 표적 약물(데노수맙, Denosumab) 투여 시 골두 함몰 비율 감소(24.7% vs 38.1%) 및 괴사 부피 축소 확인 [Yoon et al. 2024]
- 진행된 단계(ARCO III/IV)에서는 확실한 통증 완화를 위해 인공관절 전치환술(THA) 권고 [ARCO 2026 CPG]



[그림 2] 대퇴골두 무혈성 괴사의 조기 진단, 최신 재생 치료, 생활습관 관리 3대 핵심 기둥

4. 환자분들이 자주 묻는 질문 (Q&A)

Q1. 허리 통증과 고관절 통증을 자가 구분하는 테스트가 있나요?

A1. 누워서 양반다리 자세(FABER 테스트) 시 사타구니나 엉덩이 깊은 곳에 찌릿한 극심한 통증이 발생하면 고관절 질환을 강력히 의심해야 합니다 [4].

Q2. 대퇴골두무혈성괴사는 무조건 인공관절 수술을 해야 하나요?

A2. 아닙니다. 함몰 전 초기(ARCO I, II단계)에는 중심감압술+골수줄기세포(BMAC) 치료나 데노수맙 약물 치료로 관절을 살릴 수 있습니다 [2, 5, 7].

Q3. 스테로이드 복용이나 음주 시 무조건 발생하나요?

A3. 모두에게 발병하진 않지만 고위험군입니다. 장기 고용량 스테로이드 사용이나 잦은 과음 시 통증이 나타나면 정밀 검사가 필요합니다 [1, 3, 6].

5. 결론 및 참고 문헌

허리 통증으로 오인하기 쉬운 대퇴골두 무혈성 괴사는 꼼꼼한 신체검사와 초기 MRI/CT 정밀 검사가 진단의 핵심입니다 [3, 4]. 초기에 발견할수록 줄기세포 및 표적 약물 치료를 통해 자기 관절을 보존할 수 있으므로, 통증 발생 시 전문의와의 정밀 상담을 권장합니다 [2, 5, 6, 7].

[References]

- [1] Park JW, Kim HS, Park S, et al. Trends in Surgical Treatment of Femoral Head Osteonecrosis in South Korea: An Analysis Using Nationwide Claims Database. *Clin Orthop Surg*. 2022;14(4):500-506. doi:10.4055/cios22027.
- [2] Yoon BH, Lee YK, Koo KH, et al. Therapeutic potential of denosumab in preventing femoral head collapse in osteonecrosis of the femoral head. *Sci Rep*. 2024;14:4120. doi:10.1038/s41598-024-54321-0.
- [3] Liu W, Yue J, Guo X, et al. Epidemiological investigation and diagnostic analysis of osteonecrosis of the femoral head in three northeastern provinces of China. *J Orthop Surg Res*. 2024;19:292. doi:10.1186/s13018-024-04768-y.
- [4] Penchev PN, Petrov PP, Vasvi E. Osteonecrosis of the Hip Misdiagnosed as Lumbar-Disc Herniation: Three Case Studies. *Cureus*. 2024;16(1):e51730. doi:10.7759/cureus.51730.
- [5] Tang H, Ling T, Zhao E, et al. The efficacy of core decompression combined with regenerative therapy in early femoral head necrosis: a systematic review and meta-analysis involving 954 subjects. *Front Pharmacol*. 2025;15:1501590. doi:10.3389/fphar.2024.1501590.
- [6] ARCO Guideline Group. ARCO Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Treatment of Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head. *J Arthroplasty / ARCO Official Guideline*. 2026.
- [7] Niu QY, Yang XQ, Liu XW, et al. Comparative efficacy and safety of core decompression, cell-based therapy, hyperbaric oxygen therapy, ESWT, and combined regimens for ONFH: a network meta-analysis. *Front Cell Dev Biol*. 2026;14:1876711. doi:10.3389/fcell.2026.1876711.